QUÈ ÉS LA PREECLAMPSIA TARDANA?

És una complicació que pot aparèixer al final de l'embaràs i tenir conseqüències per a la salut de la mare i el nadó.

Es caracteritza per l'aparició de pressió arterial alta i signes de dany en òrgans com el fetge i els ronyons.

En la majoria de casos apareix en dones sense cap factor de risc, fent difícil detectar-la a temps i poder-la prevenir.

DUBTES?

Qualsevol dubte pel que fa a aquest estudi, es pot consultar al nostre equip:

pe37.maternitat@bcnatalresearch.org
pe37.sjd@bcnatalresearch.org
PE37@santpau.cat

BCNatal Fetal Medicine Research Center
Sabino Arana, 1
08028 Barcelona
bcnatalresearch.org

BCNATAL FETAL MEDICINE RESEARCH CENTER

Estudi per prevenir la **preeclàmpsia tardana** i millorar la salut **materna i infantil**

PE37

CLÍNIC BARCELONA Hospital Universitari

SJD Sant Joan de Déu Barcelona · Hospital

HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

ESTUDI **PE37**

L'objectiu de l'ESTUDI PE37 és trobar una estratègia senzilla que permeti identificar de manera fiable a les mares amb major risc de preeclàmpsia tardana i provocar el part abans que apareguin complicacions.

Els resultats de l'estudi podrien canviar el maneig actual de l'embaràs a nivell mundial, tenint un gran impacte en la qualitat de vida de futures mares i nadons.

Realitzen l'estudi els professionals de medicina maternofetal de BCNatal, consorci format per l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i l'Hospital Clínic, així com l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

A qui va dirigit?

Pot participar en l'estudi qualsevol dona embarassada per primera vegada, que es trobi en el seu últim trimestre d'embaràs i no hagi tingut cap complicació prèvia.

En què consisteix?

La participació només consisteix en la realització d'una anàlisi de sang entre les setmanes 35 i 37 d'embaràs.

L'anàlisi mesurarà els nivells de sFlt1 i PlGF, uns factors que es troben a la sang anomenats marcadors de funció placentària.

Se sap que aquests marcadors poden identificar les mares que desenvoluparan complicacions hipertensives primerenques en l'embaràs d'aquelles que no ho faran amb una fiabilitat molt alta. L'estudi analitzarà si també poden ser bons factors predictius al final de l'embaràs.

AIXÍ FAREM L'ESTUDI

Per conèixer si estudiar els marcadors sFlt1 i PlGF mitjançant una anàlisi de sang és millor que no fer-ho, compararem els resultats entre els dos grups següents:

GRUP CONTROL ▸ Ni la mare ni l'equip mèdic coneixeran el resultat de l'anàlisi, es continuarà amb el protocol habitual de seguiment de l'embaràs de l'hospital.

GRUP ESTUDI ▸ El metge valorarà el resultat de l'anàlisi, orientant a la mare sobre la manera més adequada de prosseguir amb el seu embaràs.

Totes les mares de l'estudi, sense importar el grup en què es trobin, rebran totes les cures mèdiques establertes pels protocols actuals.

En el moment en què la mare consenti participar en l'estudi se l'assignarà a un dels dos grups a l'atzar.